



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



INTERNATIONAL YEAR OF
PLANT HEALTH
2020

Site-ul comunei
[Signature]

PRIMĂRIA COMUNEI
COTOFENII DIN DOS
Intrare / Iesire Nr. 2810
Zi 26 Luna 06 An 2020

Oficiul Fitosanitar

Nr. 3251 / 24.06.2020

BULETIN DE AVERTIZARE NR.77

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția agenților de daunare:

LA TRANDAFIR:

PATAREA NEAGRA A FRUNZELOR (DIPLOCARPON ROSAE), FAINARE (SPHAEROTHECA PANNOSA), RUGINA TRANDAFIRULUI (PHRAGMIDIUM MUCRONATUM) + AFIDE cu unul din produsele:

Nr. crt	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza recomandata /ha	Observatii
1	TOPAS 100 EC+	Fainarea trandafirului	0,05%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta
	MOSPILAN 20 SP	Paduchele verde al trandafirului	0,0125%	
2	ORBIT 250 EW	Rugina trandafirului	0,1%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta
3	MOLINA	Patarea neagra a frunzelor de trandafir	0,05%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta
	+	Fainarea trandafirului	0,6 l	
	FASTER 10 EC	Cicada trandafirului, trips, paduchele verde al trandafirului	0,03%	

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora.

Tratamentul se executa la PED

- > Patrea neagra a frunzelor -10-25 frunze atacate
- > Fainare-10-25 frunze atacate
- > Rugina-10-25 frunze atacate

Metode profilactice de combatere:

Tratamentele se vor executa pe timp linistit, fara vant.

Patarea neagra a frunzelor este produsa de ciuperca (Diplocarpon rosae). Boala isi face aparitia pe frunzele plantelor de trandafir prin aparitia unor pete negre, circulare, dispune pe fata superioara a frunzelor. Boala evolueaza, iar petele isi maresc dimensiunile. Soiurile sensibile sunt puternic afectate. Tesaturile atacate se brunifica, iar in final se usuca. Capacitatea de fotosinteza este redusa si tufeile formeaza mai putine flori.

Rugina trandafirului produsa de ciuperca (Phragmidium mucronatum). Acesta micoza poate produce simptome pe toate organele aeriene ale plantei. Primele semne isi fac simtita prezenta la sfarsitul lunii mai prin aparitie pe partea superioara a frunzelor a unor pete de decolorare. In dreptul acestor frunze, pe partea

inferioara, apar grupuri de spori de culoarea galbena. Spre toamna, grupurile de spori isi schimba culoare si devin negricioase. In cazul unui atac puternic plantele isi pot pierde frunzisul.

Fainarea trandafirului produsa de ciuperca (*Sphaerotheca pannosa*). Aceasta ciuperca se manifesta pe toate organele aeriene ale plantei. Pe ambele fete ale frunzelor atacate, apar pete albicioase de diferite forme si marimi. Tesuturile atacate sunt necrozate, fruzele se rasucesc, iar in final se usuca. Lastarii tineri sunt acoperiti de o pasla alba miceliana. In caz de atac sever acestia se usuca. In cazuri severe, bobocii florali sunt acoperiti de un miceliu albiciosi. Acestia nu se mai dezvoltă si nu mai produc flori. Atacul se poate manifesta si pe flori, petalale acestora prezentand simptome similare cu cele de pe frunze.

Atentie! In perioada aceasta sunt in florite unele specii melifere (floarea soarelui, pepene galben, coriandru, sparceta, lucerna, otetar fals,pepenele verde, teiul, dovleacul, trifoiul).

Pentru eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clătire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clătire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995, Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

Pana la predarea acestorala distribuitorul de ppp ambalajele se vor depozita sau se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web:<https://aloe.anfd.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator:guest

-„intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se viziona toate produsele omologate se bifeaza anul curent, casetele „toate lunile, toti anii”, iar la „cautare” se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru Primarii:AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE.

Sa vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015, CU acaSI NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale /primariile cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata

Dr. ing. OANA MARIA
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdotj@anf.ro

tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).

Toti utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de

Protectia Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 aliniatul 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----

Domiciliu Fermier/sediusocial SC(Comuna, judet)-----

Ferma(numa/numar,adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,

Dr. Ing. OANA MARIA



Consilier,

Draganeanu Elisabeta

Dr. ing. OANA MARIA
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdolj@anfof.ro




Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



Site-ul
comunei
[Signature]



Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 3 252/24-06-2020

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 78

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția agenților de daunare:

LA COACAZ:

FAINARE (*SPHAROTHECA M.*) + **RUGINA** (*CRONARTIUM R.*) + **PAIANJENI**, **ACARIENI**, cu unul din produsele:

Nr. crt.	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza recomandată /ha	Observatii
1	TOPAS 100 EC	<i>Rugina coacazului</i>	0,05%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunii de pe eticheta.
	+	<i>Fainarea agrisului</i>	0,05%	
	VERTIMEC PRO	<i>Paianjeni, acarieni-arbusti fructiferi</i>	1,2 l	

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora.

Tratamentul se executa la PED

- > **Sfredelitorul tulpinilor -3-10% lastari atacati**
- > **Fainare-10-25 frunze atacate**
- > **Rugina-10-25 frunze atacate**

Metode profilactice de combatere:

Tantarul frunzelor de coacaz (*Dasineura tetensi*) - Are trei generatii pe an si ierneză într-un cocon matasos in stratul superficial al solului. Atacul se manifesta pe frunzele tinere din varful lastarilor. Acestea se deformeaza si se brunifica. Cele mai mari pagube le produce in pepinere si in plantatiile tinere.

Sfredelitorul tulpinilor de coacaz (*synanthedon tipuliformis*) - Produce pagube mari in toate plantatiile de coacaz negru, mai cu seama in pepinere. Adultul este un fluture, asemanator cu o viespe. Larvele sale intra sub scoarta ramurilor si rod galerii neregulate. In anul urmator larvele patrund in profunzime in trunchi unde consuma tesuturile conducatoare. In urma atacului, arborii se usuca si mor.

Acarienii - sunt insecte care se observa foarte greu cu ochiul liber. Sunt specii polifage, ce ataca foarte multe plante si pomi fructiferi, atat specii cultivate cat si specii spontane. Acestia se hranesc cu sucii celulari. In urma atacului, frunzele au un aspect pergamentos, florile avorteaza, iar arbustul stagneaza din crestere.

Fainarea (*Spharotheca m*) - Aceasta ciuperca ataca frunzele, fructele si lastarii tineri. Pe suprafata acestor organe apare o pasta alba miceliana. Frunzele atacate raman mici, se

usuca și cad. Pe lastari apar pete albe cu aspect prafos, ce se brunifica. In urma atacului, mugurii de rod nu se diferentiaza, iar productia scade. Fructele tinere se zbarcesc si se innegresc, iar cele mature crapa si putrezesc.

Rugina (Cronartium ribicola) - Forma cea mai frecventa de atac se manifesta pe frunze. Pe fata superioara a acestora apar pete galbene de decolorare, iar pe fata inferioara ciuperca formeaza pustule circulare de culoare bruna. Boala evolueaza iar ciuperca formeaza spori de culoare galbena, prezenti pe fata inferioara a frunzelor. Frunzele atacate se usuca si cad, iar fructele nu se matureaza normal.

Tratamentele se vor executa pe timp linistit, fara vant.

Eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal - vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate, cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei / echipamentului de stropit;

Pana la predarea acestora la distribuitorul de ppp, ambalajele se vor depozita sau se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje”- www.aiprom.ro;

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectia plantelor la furnizori precum si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995, Art 3, Alin 1, lit b modificata completata prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

Pentru eliminarea ambalajelor goale de ppp din material plastic si metal vor fi decontaminate prin tripla clatire si separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit;

La sectiunea Fitosanitar, care poate fi accesata la adresa :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web: <https://aloe.anfdf.ro>

Continue to this website(not recommended)

-utilizator:guest

-,,intra”

-se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, an, produs:ex. Pentru a se viziona toate produsele omologate se bifeaza anul curent, casetele "toate lunile, toti anii", iar la "cautare" se completeaza cu „produs apoi se apasa butonul „afisare”

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru Primarii:AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE.

Sa vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Atentie ! In perioada urmatoare infloresc unele specii melifere (salcia, pomi fructiferi, rapita, artar).

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, in conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii si cu ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015, CU acaSI NR.3242/103/21.10.2016 cu

Dr. ing. OANA MARIA
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdolj@anf.ro

ROMAPIS, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Toți utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligați să respecte condițiile de ecocondiționalitate - SMR 10. Aceștia au obligația să dețină registrul privind evidența tratamentelor și să tina evidența contabilă a produselor utilizate pe o perioadă de cel puțin 3 ani!

Se va respecta de către toți utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea în siguranță a Produselor de Protecția Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Națională Fitosanitară.

Conform HG.1230/2012 art.3 alineatul 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei.

Nume și prenume fermier/Societate comercială _____
Domiciliu Fermier/sediu social SC(Comuna, județ) _____
Ferma(număr/adresa) _____


REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza, omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,
Dr. Ing. OANA MARIA



[Handwritten signature]

Consilier,

Dragăneanu Elisabeta

[Handwritten signature]

Dr. ing. OANA MARIA
Coordonator
T +40(251) 448191
ofdolj@anf.ro