



Autoritatea Națională Fitosanitară


B-dul Voluntari nr.13
Voluntari, 077190

T -40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



Oficiul Fitosanitar Dolj

Nr. 1229/12.04.2021



BULETIN DE AVERTIZARE NR. 23

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția agenților de daunare:

LA COACAZ:

TANTARUL FRUNZELOR DE COACAZ(*DASINEURA TETENSI*), **SFREDELITORUL TULPINILOR**(*SYNANTHEDON TIPULIFORMIS*) S.) + **FAINARE** (*SPHAROTHECA M.*)+ **RUGINA** (*CRONARTIUM R*)+ **PAIANJENI, ACARIENI**, cu unul din produsele:

Nr. crt.	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza recomandata /ha	Observatii
1	TOPAS 100 EC + NURELLE D 50/500 EC + VERTIMEC PRO	<i>Rugina coacazului</i> <i>Fainarea agrisului</i> <i>Tantarul frunzelor de coacaz</i> <i>Sfredelitorul tulpinilor de coacaz</i> <i>Paianjeni, acarieni-arbusti fructiferi</i>	0,05% 0,05% 0,08% 1,2 l	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora.

Tratamentul se executa la PED

- **Sfredelitorul tulpinilor -3-10%lastari atacati**
- **Fainare-10-25 frunze atacate**
- **Rugina-10-25 frunze atacate**

Metode profilactice de combatere:

Tantarul frunzelor de coacaz (*Dasineura tetensi*) - Are trei generatii pe an si iernea intr-un cocon matasos in stratul superficial al solului. Atacul se manifesta pe frunzele tinere din varful lastarilor. Acestea se deformeaza si se brunifica. Cele mai mari pagube le produce in pepinere si in plantatiile tinere.

Sfredelitorul tulpinilor de coacaz (*synanthedon tipuliformis*) - Produce pagube mari in toate plantatiile de coacaz negru, mai cu seama in pepiniere. Adultul este un fluture, asemanator cu o viespe. Larvele sale intra sub scoarta ramurilor si rod galerii neregulate. In anul urmator larvele patrund in profunzime in trunchi unde consuma tesuturile conducatoare. In urma atacului, arborii se usuca si mor.

Acarienii - sunt insecte care se observa foarte greu cu ochiul liber. Sunt specii polifage, ce ataca foarte multe plante si pomi fructiferi, atat specii cultivate cat si specii spontane. Acestia se hranesc cu suc celular. In urma atacului, frunzele au un aspect pergamentos, florile avorteaza, iar arbustul stagneaza din crestere.

Fainarea (*Spharotheca m*) - Aceasta ciuperca ataca frunzele, fructele si lastarii tineri. Pe suprafata acestor organe apare o pasla alba miceliana. Frunzele atacate raman mici, se usuca si cad. Pe lastari apar pete albe cu aspect prafos, ce se brunifica. In urma atacului, mugurii de rod nu se diferentiaza, iar productia scade. Fructele tinere se zbarcesc si se innegresc, iar cele mature crapa si putrezesc.

Rușina (*Cronartium ribicola*) - Forma cea mai frecventă de atac se manifestă pe frunze. Pe fața superioară a acestora apar pete galbene de decolorare, iar pe fața inferioară ciuperca formează pustule circulare de culoare brună. Boala evoluează iar ciuperca formează spori de culoare galbenă, prezenți pe fața inferioară a frunzelor. Frunzele atacate se usucă și cad, iar fructele nu se maturează normal.

Tratamentele se vor executa pe timp liniștit, fără vânt.

Eliminarea ambalajelor goale de PPP din material plastic și metal - vor fi decontaminate prin triplă clătire și separarea de capace iar ambalajele secundare din carton, folie aluminiu vor fi curățate și pliate, cu folosirea ulterioară a apei rezultate în rezervorul instalației / echipamentului de stropit;

Până la predarea acestora la distribuitorul de PPP, ambalajele se vor depozita sau se pot preda în cadrul Programului Național „SCAPA de ambalaje” - www.aiprom.ro;

Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protecția plantelor la furnizori precum și neefectuarea operației de clătire de trei ori a ambalajului după utilizarea produsului constituie contravenție și se sancționează conform OG 4/1995, Art 3, Alin 1, lit b modificată completată prin OG 41/2007, Art 7, punctul 3 subpunctul 1 lit.b.

lit.b.

La secțiunea Fitosanitar, care poate fi accesată la adresa: <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

Adresa de web: <https://aloe.anfd.ro>

Continue to this website (not recommended)

-utilizator: guest

-„intra”

-se completează casutele cu datele care interesează: data, an, produs: ex. Pentru a se viziona toate produsele omologate se bifează anul curent, casetele „toate lunile, toți anii”, iar la „cautare” se completează cu „produs apoi se apasă butonul „afisare”

Înainte de utilizarea instalației de aplicat PPP, verificați dacă aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. De asemenea, instruiți operatorul pe linie de utilizare a PPP și întocmiți procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protecția plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care se găsesc în baza de date PEST-EXPERT.

Pentru Primarii: AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE.

Sa vor lua măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Atenție ! În perioada următoare înfloresc unele specii melifere (salcia, pomi fructiferi, rapita, artar).

Respectați cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și animalelor, în conformitate cu legea nr. 383/2013 a apiculturii și cu ordinul nr. 127/1991 al ACA din România; Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala și 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum și cu Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015, CU acaSI NR.3242/103/21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Totii utilizatorii de PPP (prestatorii, fermierii) sunt obligați să respecte condițiile de ecocondiționalitate - SMR 10. Aceștia au obligația să dețină registrul privind evidența tratamentelor și să țină evidența contabilă a produselor utilizate pe o perioadă de cel puțin 3 ani!

Se va respecta de către toți utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea în siguranță a Produselor de

Protecția Plantelor /2016 postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Națională Fitosanitară.

Conform HG.1230/2012 art.3 alineatul 2, nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a PPP pe care le utilizează se sancționează cu amendă de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----
Domiciliu Fermier/sediu social SC(Comuna, judet)-----
Ferma(numa/numar, adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire Ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.

Coordonator,

DANCIU IULIANA.



Consilier,

Draganeanu Elisabeta