PPP OMOLOGATE ÎN ROMÂNIA PENTRU CULTURA DE TOMATE

FUNGICIDE

Nr. crt.	Produs de protecţie a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	**ALLSTAR 250 SC**	Phytophtora infestans (Mana tomatelor), Alternaria spp. (Alternarioza)	0,75-1,0 L/ha (in functie de gradul de infestare)
2.	**AZUMO WG**	Fainarea	2,0 kg/ha
3.	**BOTECTOR**	Botrytis cinerea (Putregaiul cenusiu)	1,0 kg/ha
4.	**BOUILLIE BORDELAISE WDG**	Pseudomonas tomato (patarea pustulara), Alternaria solani (alternarioza), Phytophthora infestans (mana), Xanthomonas vesicatoria (basicarea fructelor)	0,75% (7,5 kg/ha)
5.	**CABRIO TOP**	Mana, fainarea, patarea alba, patarea cafenie, patarea bruna	1,5 - 2,0 kg/ha
6.	**CALIZI / (SINPRO - a doua denumire comerciala)**	Mana, alternarioza, fainarea, patarea cafenie	0,8 l/ha
7.	**CAPTAN 80 WDG / (CAIMAN - a doua denumire comerciala)**	Mana solanaceelor, patarea bruna	0,15% (1,5 kg/ha)
8.	**CARIAL STAR**	Mana, alternarioza	0,6 l/ha pentru culturi în câmp si spaţii protejate
9.	**CASINO ROYALE**	Alternaria spp. (Alternarioza)	1,5 Kg/ha
10.	**CHAMP 77 WG / (COPPERMAX - a doua denumire comerciala)**	Basicarea fructelor, patarea pustulara	2,0 kg/ha (0,2%)
11.	**CUPROFIX ULTRA / NOVICURE-a doua denumire comerciala**	Mana, alternarioza, putregaiul radacinilor si fructelor, basicarea fructelor, patarea pustulara	1,6-2,4 kg/ha
12.	**CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)**	Mana, alternarioza Mana Mana	3,0-4,0 l/ha 5,3 l/ha pentru culturi în spaţii protejate 53 ml/100 mp pentru culturi în spaţii protejate
13.	**CURENOX 50**	Phytophthora infestans (mana tomatelor), Alternaria solani (alternarioza)	1,5-2,0 kg/ha
14.	**DAGONIS**	Fainarea	0,6 L/ha
		Alternarioza, patarea cafenie	1,0 L/ha
		Fainarea	0,6 L/ha
		Alternarioza	1,0 L/ha
15.	**DIFCOR 250 EC**	Alternarioza, putregaiul cenuşiu, putregaiul	0,5 l/ha

		alb	
16.	**EQUATION PRO**	Phytophthora infestans (mana tomatelor), Xanthomonas vesicatoria (basicarea fructelor)	0,4 kg/ha
17.	**FLOSUL**	Fainarea	2,0 L/ha
18.	**FLOWBRIX / (COPPER-FIELD - a doua denumire comerciala)**	Mana, agenti patogeni bacterieni	2,6 ml/10 mp
		Mana, agenti patogeni bacterien	2.5 l/ha
19.	**FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)**	Mana tomatelor	0,15%
		Caderea rasadurilor	0,15%(4-5 sol./mp)
		Mana tomatelor	0,15%(4-5 sol./mp)
		Rizoctonioza	0,15%(4-5 sol./mp)
20.	**KOCIDE 2000**	Mana, patarea pustulara	2,0 kg/ha (0,2%)
21.	**LIETO / (ZETANIL - a doua denumire comerciala)**	Mana	0,40 kg/ha
22.	**MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)**	Mana tomatelor	0,15 % (1,5 kg/ha in 1000 L apa)
23.	**ORIUS 25 EW / (SALVATOR 25 EW - a doua denumire comerciala)**	Alternarioza	0,05% (0,5 L/ha in 1000 L apa)
24.	**POLYRAM DF**	Patarea cafenie a tomatelor, alternarioza, mana tomatelor, patarea alba a frunzelor de tomate	0,2%
25.	**PROPLANT 72,2 SL**	Mana de sol a tomatelor	0,15-0,25% (3-5 l sol./m2)
		Mana tomatelor	0,15-0,25% (1,5-2,5 l/ha)
		Căderea plăntuţelor	0,15-0,25% (3-5 l sol./m2)
26.	**PYRUS 400 SC / (PAPYRUS 400 SC - a doua denumire comerciala)**	Putregaiul cenuşiu	0,15% (1,5 l/ha)
27.	**REFLECT**	Fainarea	1,0 l/ha se aplica la culturi in sere si solarii
28.	**SCALA**	Botrytis cinerea (Putregaiul cenuşiu)	2,0 L/ha
29.	**SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)**	Alternarioza (patarea bruna)	0,5 L/ha
30.	**SIGNUM /(SYREX STAR -doua denumire comerciala)**	Putregaiul cenusiu, fainarea	1,5 kg/ha
31.	**SULBARI**	Leveillula taurica (fainarea)	5,0 kg/ha
32.	**SWITCH 62,5 WG**	Putregaiul cenusiu	0,8-1,0 kg/ha
33.	**VINCARE 51,7 WG**	Mana tomatelor	1,6-2,0 kg/ha
34.	**ZEAMA BORDELEZA TIP „MIF" / (ZEAMA BORDELEZA VALLES - a doua denumire comerciala)**	Phytophtora infestans (Mana tomatelor)	3,75-5,0 kg/ha
		Alternaria solani (Alternarioza)	3,75-5,0 kg/ha
35.	**DOMARK 10 EC**	Fainarea	0,4 L/ha (0,04%)

36.	**REVUS 250 SC**	Mana tomatelor	0,6 l/ha
		Phytophthora infestans (mana tomatelor)	0,6 L/ha
37.	**VITRA 50 WP / (CUPRIDIN - a doua denumire comerciala)**	Mana, alternarioza, patarea bacteriana, putregaiul radacinilor si fructelor, patarea pustulara a fructelor de tomate	1,5-2,0 kg/ha
38.	**CYCLO-R LIQUIDO**	Mana tomatelor	2,4-4,0 l/ha
39.	**KANTAREL**	Fainarea (sera)	0,3-0,4 L/ha (0,03-0,04%)
40.	**OMIX / (EDEGAL - a doua denumire comerciala)**	Mana, caderea plantutelor	300 mL/ m^3 /substrat
		Mana, caderea plantutelor	5-6 mL/mp
41.	**COPFORCE EXTRA / (CUPMAN - a doua denumire comerciala)**	Mana, alternarioza	2,0 kg/ha
42.	**CUPERTINE SUPER / (COMBIDUO COBRE - a doua denumire comerciala)**	Mana, alternarioza, antracnoza, vestejirea bacteriana, arsura bacteriana	3,5 kg/ha
		Mana tomatelor	3,5 kg/ha
43.	**TAEGRO**	Mana tomatelor	0,37 kg/ha
		Mana tomatelor, fainarea, patarea bruna a frunzelor de tomate (alternarioza)	0,37 kg/ha
44.	**THIOVIT JET 80 WG**	Fainarea (efect secundar asupra acarienilor)	5,0 kg/ha
45.	**ARMETIL COBRE / (MANOXIN COMBI-a doua denumire comerciala)**	Mana tomatelor	2,5 kg/ha
46.	**REVUS 250 SC**	Mana tomatelor	0,6 l/ha
		Phytophthora infestans (mana tomatelor)	0,6 L/ha
47.	**LUNA PRIVILEGE 500 SC**	Putregaiul cenusiu	0,5 l/ha (0,05%)
48.	**LUNA SENSATION 500 SC**	Botrytis cinerea (putregaiul cenusiu)	0,6 L/ha
49.	**FYTOSAVE**	Leveillula taurica (Fainare)	2,0 L/ha
50.	**LEGADO /(DIAGONAL - a doua denumire comerciala)**	Fainarea	0,8 l/ha
51.	**EVALIA / (TAZER - a doua denumire comerciala)**	Mana, fainarea, alternarioza	0,05-0,08% (50-80 ml/100 l apa)
52.	**PREVICUR ENERGY**	Mana, caderea plantutelor, spatii protejate	3 L/ha tratament aplicat prin picurare
		Mana, caderea plantutelor, spatii protejate	3 mL/mp tratament aplicat la sol
53.	**SERENADE ASO**	Botrytis cinerea (putregaiul cenusiu), Pseudomonas syringae (patarea pustulara a fructelor), Xanthomonas spp. (patarea bacteriana a frunzelor)	4,0-8,0 L/ha
		Fusarium oxysporum (fusarioza)	10,0 L/ha
54.	**TELDOR 500 SC**	Putregaiul cenusiu, spatii protejate	0,8 L/ha

55.	**TRIUMF 40 WG**	Mana, spatii protejate	2,0-2,5 kg/ha
56.	**BASAMID GRANULE**	Mana de sol, fuzarioza, ofilirea vasculara	500 kg/ha
57.	**SONATA**	Leveillula taurica (fainarea), Oidium lycopersici (fainarea)	5,0-10,0 L/ha
58.	**T34 BIOCONTROL**	Caderea plantelor	0,5 g/mp de substrat pana la 5 cm adancime
		Caderea plantelor	0,01 g/l sol sau substrat sau 0,005g/l+0,005 g/l
		Caderea plantelor	10 g/ m^3 de substrat

INSECTICIDE

Nr. crt.	Produs de protecţie a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	**AFFIRM**	Minierul frunzelor de tomate, omida fructelor	1,5 kg/ha
2.	**AVAUNT 150 EC**	Omida fructelor de tomate, omida sfeclei	0,250 l/ha în câmp şi spaţii protejate)
3.	**BELTHIRUL**	Omizile fructelor	0,25-0,50 kg/ha (800-1000 l apa/ha)
4.	**COLUMBO 0,8 MG**	Viermii sarma, buha semanaturilor	12 kg/ha
5.	**CORAGEN**	Omida fructelor, molia tomatelor	175 ml/ha
6.	**COROCID SUPER**	Coropisnita	20 kg/ha
7.	**ERCOLE**	Buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma,viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha
8.	**FLORAMITE 240 SC**	Paianjenii	0,4-0,6 l/ha
9.	**FURY GEO**	Viermii sarma	12-15 kg/ha
10.	**LEBRON 0,5 G**	Viermii sarma, buha semanaturilor, Blaniulus guttulatus, centipede, musca morcovului, carabusul de mai	15-20 kg/ha
11.	**MICROSED GEO / (SOBEK UP - a doua denumire comerciala)**	Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp. (buha), Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Ceutorhynchus pleurostigma (gargarita), Blaniulus guttulatus (sarpele orb, miriapod), Hylemya spp. (muste), Chamaepsila rosae (musca morcovului), Tipula spp. (ţânţari)	16-20 kg/ha se aplica prin incorporare la semanat sau transplantare
12.	**PLINTO 2,5 EC / (ALFASURE 2,5 EC - a doua denumire comerciala)**	Omida fructelor, buha gama	0,4-0,6 l/ha
13.	**POLECI / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala)**	Afide, tripsi, musculita alba de seara	30-50 ml/hl apa (0,03-0,05 %)
14.	**TRIKA EXPERT**	Buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma,viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha
15.	**ALVERDE**	Omida fructificaţiilor, larve L1-L3	0,1 % (1,0 l/ha/1000 l apa)

16.	**SIVANTO PRIME 200 SL**	Afide (Aphis gossypii, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae); Musculiţe (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)	0,56 L/ha
17.	**VOLIAM TARGO**	Omida fructelor, buha legumelor	0,8 L/ha
18.	**GRIAL / (DIEDRO - a doua denumire comerciala)**	Afide, omizi	0,5 L/ha (50-166 mL/hL)
19.	**VERTIMEC PRO**	Păianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha
20.	**MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)**	Tripsul californian	0,04%
21.	**FASTER 10 CE**	Păduchele verde	0,02% (0,2 l/ha)
22.	**VYDATE 10 L**	Nematozi (nematodul tulpinilor si bulbilor, nematozii cu chisti, nematozii galicoli, Pratylenchus, Tylenculus) Insecte (omida miniera, musculita alba de sera, afide, musculita tutunului, paduchele verde al piersicului, tripsul tutunului)	10 L/ha,câmp
		Nematodul galicol al radacinilor, musculita alba de sera, musca minieră a solanaceelor	10 L/ha, sera si solarii
23.	**VYDATE 10 G**	Musculita alba de sera, nematozii galicoli, nematodul tulpinilor	30,0-55,0 kg/ha, câmp, sera si solarii
24.	**LIMOCIDE**	Thrips tabaci	4,0 L/ha,sere
		Trialeurodes vaporariorum (Musculita alba de sera)	2,0 L/ha ,sere
25.	**FLIPPER**	Afide, musculita alba de sera, acarieni	20,0 L/ha, câmp
		Afide, musculita alba de sera, acarieni	16,0 L/ha, spaţii protejate)
26.	**APACHE / (VERTAB - a doua denumire comerciala)**	Musca miniera,seră	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel
		Musca miniera, câmp	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl)
		Acarianul rosu comun, acarianul lat, câmp	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl)
27.	**AZATIN EC**	Afide,Trialeurodes vaporariorum, Leptinotarsa decemlineata, Liriomyza spp., Noctuide (Trichoplusia ni, Helicoverpa armigera, Autographa gamma, Mamestra brassicae, Spodoptera exigua), Tripşi, Tuta absoluta	1,0 - 1,5 L /ha, sere Se aplică la avertizare.
28.	**BACTOSPEINE DF / (DIPEL DF - a doua denumire comerciala)**	Omida fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului	0,5-1,0 kg/ha , sere
29.	**BERMECTINE**	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filocoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL), sere
		Molia tomatelor	1,0 L/ha (100 mL/hL), sere
		Muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL), sere
		Acarianul rosu comun, acarianul lat, mustele	0,15-1,0 L/ha (50-100

			mL/hL) , câmp
30.	**PREV GOLD**	Acarieni (Tetranychus urticae), Musculita alba (Trialeurodes aporariorum)	0,4-0,8% (maxim 8 L/ha)
31.	**SAFRAN 1.8 EC / (VARGAS 1.8 EC - a doua denumire comerciala)**	Musca miniera	0,09%(0,9 l/ha in 1000 l apa) nu se aplica in timpul inlforitului.
32.	**HARPUN**	Musculita alba de sera	75 ml/100 L apa , solarii
33.	**JUVINAL 10 EC**	Musculita alba de sera	0,05% , solarii
34.	**DELTAM**	Afide	8,0 mL in 10 L apa/100 mp
		Omizi defoliatoare	5,0 mL in 10 L apa/100 mp
35.	**MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)**	Helicoverpa armigera(Omida fructelor), Macrosiphon euphorbiae (Paduchele verde al solanaceelor)	0,05% (0,5 L/ha în 1000 L apa)
36.	**VANTEX 60 CS / (NEXIDE 60 CS - a doua dnumire comeciala)**	Omida capsulelor (larve L1 - L2)	0,02 % (0,2 l p.c. /ha)
37.	**VERTIMEC 1,8% EC**	Acarieni	60 mL/hl , câmp
		Musca miniera	60-80 mL/hl , sera
		Acarieni, tripsul californian, musca miniera, trpsul comun, acarieni galicoli,	60-80 mL/hl , spaţii protejate
38.	**LASER 240 SC**	Musca miniera a solanaceelor	0,05%
39.	**SANIUM SYSTEM**	Afide (Aphis gossypii, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae); Trialeurodes vaporariorum (Musculita alba de sera)	4,5 L/ha , sere şi solarii
40.	**MINECTO ALPHA**	Tripsul californian, musculita alba de sera, omizi defoliatoare, omida fructelor, musca miniera, molia tomatelor	1,0-1,25 L/ha (1,0 L/ha-irigare prin picurare sau 1,25 L/ha-pulverizare)
41.	**NOFLY WP**	Musculita alba de sera	200-250 g/hl
42.	**REQUIEM PRIME**	Musculita alba de sera, musculita alba a bumbacului, tripsul californian, acarianul rosu comun	0,65 % maxim 10 L/ha
43.	**SANMITE 10 SC**	Paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, musculita alba de sera, musculita tutunului	1,5 L/ha
44.	**SPRUZIT**	Aphis gossypii, Aulacorthum solani (Afide)	6,0 L/ha in 600 L apa (talia plantei <50 cm)
		Aphis gossypii, Aulacorthum solani (Afide)	9,0 L/ha in 900 L apa (talia plantei 50-125 cm)
		Aphis gossypii, Aulacorthum solani (Afide)	12,0 L/ha in 1200 L apa (talia plantei >125 cm)
45.	**CYPERGUARD 25 EC / (FOSTOC - a doua denumire comerciala)**	Paduchele solanaceelor, gandacul din Colorado	0,008%
46.	**DELMUR**	Aphis gossypii ,Macrosiphum euphorbiae ,	500 mL/ha

		Myzus persicae ,Helicoverpa armigera , Spodoptera sp.,Spodoptera exigua , Spodoptera littoralis, Agrotis segetum, Heliothis sp., Chrysodeixis calcite, Autographa gamma, Tuta absoluta.	

ACARICIDE

Nr. crt.	Produs de protecţie a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	**NISSORUN 10 WP**	Acarianul rosu comun	1,0 kg/ha
2.	**KANEMITE SC**	Paianjenul rosu comun	In spatii protejate 1,25 L/ha in 1200 L apa
3.	**MOVENTO 100 SC**	Tetranychus urticae (Acarianul roşu comun)	0,75 L/ha
4.	**VERTIGO 018 EC**	Acarianul stacojiu	0,05 %

ERBICIDE

Nr. crt.	Produs de protecţie a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	**BUZZIN**	Buruieni dicotiledonate si unele monocotiledonate	0,50 kg/ha aplicat la plantare
2.	**MATECOR EXPRESS**	**Buruieni dicotiledonate si monocotiledonate anuale:** teisor, stir, scanteiuta, spanac salbatic, meisor, iarba barboasa, euforbia, fumarita, sugel puturos, raigras, musetelul, firuta, hrisca, grasita, mohor, mustar salbatic, susai, rocoina, urzica, ventrili	0,4 kg/ha Se aplica pretransplantare
		Buruieni dicotiledonate si monocotiledonate anuale: teisor, stir, scanteiuta, spanac salbatic, meisor, iarba barboasa, euforbia, fumarita, sugel puturos, raigras, musetelul, firuta, hrisca, grasita, mohor, mustar salbatic, susai, rocoina, urzica, ventrili	0,4-0,75 kg/ha Se aplica post rasarire si post-transplantare ,stadiul de 8-9 frunze(BBCH 18-19)
3.	**SHARPEN 40 SC / (PENDISOL 40 SC - a doua denumire comerciala)**	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate	3,3-4,1 l/ha se aplica preemergent cu 2-3 zile inainte de plantare
4.	**STOMP AQUA / (PROWL AQUA - a doua denumire comerciala)**	Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate	1,0-3,0 l/ha inaintea transplantarii
5.	**STRATOS ULTRA / (FOCUS - a doua denumire**	Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (aplicat singur) Postemergent

	comerciala)	Buruieni monocotiledonate perene	2L/ha+2L/ha adjuvant (DASH) Postemergent
		Buruieni monocotiledonate anuale	1-2 L/ha (aplicat singur) Postemergent
		Buruieni monocotiledonate anuale	2L/ha+2L/ha adjuvant (DASH) Postemergent
6.	**TARGA MAX / (GRAMIN MAX - a doua denumire comerciala)**	Buruieni monocotiledonate anuale	0,4-0,6 l/ha Postemergent, buruieni monocotiledonate anuale 4-6 frunze,Shorgum halepense pana la 15-25 cm,Agropyron repens sub 20 cm
		Buruieni monocotiledonate perene	0,6-1,25 l/ha Postemergent, buruieni monocotiledonate anuale 4-6 frunze,Shorgum halepense pana la 15-25 cm,Agropyron repens sub 20 cm
7.	**WISH TOP / (QUICK FORTE - a doua denumire comerciala)**	Buruieni monocotiledonate anuale si perene	0,83-1,25 L/ha
8.	**SENCOR LIQUID 600 SC**	Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate	0,45 l/ha Preemergent Tomate semanate
		Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate	0,35 l/ha Postemergent (la minim 40 de zile de la tratamentul in preemergență. Tomate semanate
		Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate	0,6 l/ha Preemergent, Tomate transplantate
9.	**FUSILADE FORTE**	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 l/ha Tomate semanate direct in camp
		Buruieni monocotiledonate perene	1,0 l/ha Tomate semanate direct in camp
		Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 l/ha postemergent Tomate transplantate
		Buruieni monocotiledonate perene	1,3 l/ha postemergent Tomate transplantate
10.	**DEVRINOL 45 F**	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate	3,0-4,0 L/ha se aplica inainte de semanat cu incorporare Tomate semanate direct in camp
11.	**DUAL GOLD 960 EC /(TENDER-a doua denumire comerciala)**	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale (mohor, busuioc salbatic)	1,0 l/ha Preemergent Tomate in camp (cultura infiintata prin rasad)

12.	**METOS 960 EC**	Buruieni anuale monocotiledonate şi dicotiledonate (Setaria, Galinsoga)	1,0 L/ha Se aplica preemergent Tomate transpl., tomate semănate direct in camp.
13.	**AGIL 100 EC / (ZETROLA - a doua denumire comerciala)**	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 L/ha ,postemergent Tomate transplantate
		Costrei din rizomi	1,0 L/ha ,postemergent Tomate transplantate
14.	**METRIPHAR 70 WG**	Buruieni dicotiledonate `si unele monocotiledonate	0,3 kg/ha Tomate transplantate
15.	**PANTERA 40 EC / (RANGO - a doua denumire comerciala)**	Buruieni monocotiledonate anuale	0,75 l/ha postemergent Tomate transplantate
16.	**TARGA SUPER 5 EC**	Buruieni monocotiledonate anuale	1,0 l/ha postemergent Tomate transplantate
17.	**TITUS 25 DF / (TAROT - a doua denumire comerciala)**	Buruieni monocotiledonate anuale şi perene şi unele dicotiledonate	40-60 g/ha +Trend90, 0,1 % surfactant Postemergent Se aplica primăvara de la prima frunză până la prima inflorescenţă a culturii (BBCH 11-51)

REGULATORI DE CRESTERE

Nr. crt.	Produs de protecţie a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	**ATONIK**	Obtinerea de spor de productie	0,5 l/ha Se aplica de la aparitia primelor inflorescente pana la apariţia primelor fructe (BBCH 51-71)
2.	**SmartFresh ProTabs**	Regulator de crestere	0,084 g/ m^3 - se aplica nu mai tarziu de 24 de ore, dupa recoltare
3.	**PLANTLINE E4**	Combaterea maturizarii neuniforme	0,0125 L/m^3 Se aplica la sfarsitul ciclului de productie, timp de 6 saptamani,noaptea,prin fumigare. Tomate spatii protejate

NEMATOCIDE , TRATAMENT SOL

Nr. crt.	Produs de protecţie a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	**AFROMYL**	Nematozi	10,0 L/ha Se aplica la plantare / transplantare
2.	**BASAMID GRANULE**	Nematodul galicol al radacinilor	500 kg/ha - se administreaza la sol cu incorporare, inante de plantare
3.	**NEMATHORIN 10 G**	Nematodul galicol al radacinilor	15 kg/ha Tomate sera si solarii
4.	**NEMASOL 510**	Patogeni, nematozi, buruieni	700 L/ha -se aplica inainte de plantarea rasadurilor Tomate sera
5.	**TERVIGO**	Nematozii galicoli	5,0 L/ha Tomate spatii protejate
6.	**VELUM PRIME 400 SC**	Meloidogyne sp. (Nematozi), Leveillula taurica (Fainare)	625 mL/ha Tomate sera si solarii
7.	**VYDATE 10 L**	Nematozi (nematodul tulpinilor si bulbilor, nematozii cu chisti, nematozii galicoli, Pratylenchus, Tylenculus) Insecte (omida miniera, musculita alba de sera, afide, musculita tutunului, paduchele verde al piersicului, tripsul tutunului)	10 L/ha
		Nematodul galicol al radacinilor, musculita alba de sera, musca minieră a solanaceelor	10 L/ha Tomate sera si solarii

Rodenticide, Moluscocide

Nr. crt.	Produs de protecţie a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	**IRONMAX PRO**	Limacşi	7,0 kg/ha Tomate seră
2.	**AGROSAN B**	Melcii fără cochilie	15 kg/ha(administrare pe sol, fără incorporare) Tomate in camp
3.	**SLUXX HP**	Melci fără cochilie (limacşi); Melci cu cochilie	7,0 kg/ha Se aplică uniform pe sol, la începutul infestării.
4.	**ARVALIN**	Şoarecele de câmp	5 bucăti/galerie